

REICHS=FORMELN

Rats Apotheke
Wilhelm Meisinger
Lehrte

UB Braunschweig

84



2245-052-8

Ex Libris
Prof. Dr. Wolfgang Schneider
33 Braunschweig
Einsteinstr. 14

Kais. Apotheke
Wilhelm Nitschlag

REICHS-FORMELN

RF

2245-0528

EINHEITLICHE REZEPTVORSCHRIFTEN
FÜR DAS GROSSDEUTSCHE REICH

*Magistralformeln
nach wirtschaftlichen Grundsätzen
zusammengestellt*



1944

DUNCKER & HUMBLLOT / BERLIN NW7

Entsänert 2003



Nachdruck verboten

Satz und Druck der Offizin Haag-Drugulin in Leipzig

Vorwort

Das Streben nach Einheit auf allen Gebieten im neuen Reich machte es notwendig, auch den wichtigen Abschnitt der magistralen Arzneiverordnungsweise nach zweckmäßigen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Sinne einer gesetzmäßigen Vereinheitlichung neu auszurichten. Mehr denn je verlangt der Arzt heute nach einem Wegweiser und Ratgeber, der ihm bewährte, preiswerte Arzneikombinationen zur Verfügung stellt und ihm dabei zur Hand ist, eine rezepturmäßige, individuelle Therapie zu betreiben.

Magistrale Rezeptformel-Sammlungen besitzen wir viele Jahrzehnte; sie hatten teils nur lokale Bedeutung, vielfach waren sie aber auch im ganzen Reich verbreitet und erfreuten sich teilweise sogar im Ausland großer Beliebtheit. So vor allem die älteste dieser Sammlungen, die *Formulae Magistrales Berolinenses* (FMB), die etwa 70 Jahre alt ist und in allen Arzneiverordnungs-Lehrbüchern und Manualen Erwähnung findet. In neuerer Zeit trat hinzu die Sammlung der Rheinisch-Westfälischen Formeln (RW), die sich im Westen des Reiches rasch durchsetzte, und die der Danziger Wirtschaftlichen Rezeptformeln (DW), die zunächst als Notmaßnahme gegen polnische Zollpolitik galt und gemeinsam von der Danziger Ärzte- und Apothekerschaft herausgegeben wurde. Dazu kommt noch die Württembergische Formelsammlung. — Alle diese Sammlungen bilden zusammen die Grundlage dieser neuen Einheitssammlung.

Es ist klar, daß die Vielheit der bestehenden verschiedenen Sammlungen nicht im Zuge einer größtmöglichen Vereinheitlichung und Vereinfachung lag, teilweise sogar die Sicherheit der arzneilichen Versorgung gefährdete, indem Rezeptformeln gleichen Namens in den einzelnen Sammlungen abweichende Zusammensetzungen aufwiesen. Zu welchen Schwierigkeiten das praktisch führt, wird so recht klar bei Beobachtung der Verhältnisse in den rückgegliederten Gebieten des deutschen Ostens, wo eine Wanderbewegung von deutschen Ärzten

und Apothekern aus allen Gauen Deutschlands einsetzte und demzufolge sämtliche Formelsammlungen neben- und durcheinander Anwendung finden. Gerade diese Ereignisse bewiesen die dringende Notwendigkeit, eine rasche Abstellung der Verhältnisse herbeizuführen.

Bei der Bearbeitung der neuen Einheitssammlung RF wurde der oberste Grundsatz nicht verlassen, Altbewährtes nach Möglichkeit zu übernehmen, die vorhandenen Formeln chemisch und pharmakologisch zu überprüfen und modernen Anschauungen und Verhältnissen anzupassen. Gleichzeitig fanden die bewährtesten neuen Mittel Aufnahme, insbesondere die modernen Stada-Präparate, die damit den ihnen gebührenden Platz auch in der rezepturverordneten Kombinationstherapie einnehmen.

Bei der Dosierung wurden grundsätzlich die Haffnerschen Normdosen berücksichtigt; es ist aber durchaus erwünscht, wenn der Arzt nach eigenem Ermessen und eigenen Erfahrungen sowohl die Dosierung wie auch die hier festgelegten Standardkombinationen verändert und sie den jeweiligen besonderen, individuellen Erfordernissen anpaßt. Der Sinn des Büchleins ist in erster Linie, dem Arzt Anleitung zu sein und Beispiele einer erprobten und dabei wirtschaftlichen Verordnungsweise zu geben; mit einem Durchschnittspreis des Einzelrezepts von RM 1.22 wird diesen Anforderungen entsprochen.

Bei der Bearbeitung wurde weitgehend der Gesichtspunkt berücksichtigt, möglichst heimische Grundstoffe zu verwenden, und zwar solche, die in reichem Maße vorhanden sind. So wurden bei einer Reihe bekannter Rezeptformeln wie Pulvis haemorrhoidalis, Tinctura amara acida, Tinctura anti-diarrhoica, Tinctura stomachica usw. Zweitvorschriften geschaffen, die den Zusatz „B“ führen und im Krieg zu bevorzugen sind, da sie nur reichlich vorhandene Grundstoffe enthalten. Es sind jedoch keineswegs „Ersatz“-Vorschriften, sondern im Effekt völlig gleichwertige, die auch späterhin erhalten bleiben. Auch heimische, in großen Mengen anfallende Drogen wurden besonders berücksichtigt. In den Fällen, wo in der Verordnung bei gleich-

gerichteter Tendenz eine gewisse Variation erwünscht ist, wurden Reihenrezepte gleichen Namens mit dem Zusatz I, II, III usw. aufgenommen. Bei der Suppositorienherstellung wird auf die Verarbeitung der neuen Trägermasse Postonal besonders Rücksicht genommen; sie besitzt gegenüber den bisherigen Arzneiträgern auf Fettbasis, wie Oleum Cacao, den besonderen Vorteil, daß sie auf Grund der Anwesenheit indifferenter, hydrophiler Emulgatoren wasser- und damit darmsaftlöslich ist. In den Fällen einer gewünschten schnellen Resorption wird diese Masse zu bevorzugen sein; sie wird auch nicht ranzig und ist infolge hohen Schmelzpunktes wärmebeständig. — Gummi arabicum wird durch Tyloeschleim abgelöst. Die standardisierten Vegetabilien der „Stada“ und die daraus gewonnenen Galenika finden weitgehende Verwendung. —

Vorschläge für Verbesserungen und Erweiterungen sind stets erwünscht; der Bearbeiter¹ ist für jede Anregung dankbar. Allen denen, die an der Sammlung mitarbeiteten, sei der Dank ausgesprochen, insbesondere dem Institut für Arzneimittelforschung und Arzneimittelpfprüfung, seinem Leiter, Herrn Pharmazierat Hering und dessen Mitarbeitern, den Herren Dr. Koch und Dr. Dultz; ferner sei besonders gedankt Herrn Dozent Dr. Forst, München, dem pharmakologischen Mitarbeiter des Instituts, sowie den zahlreichen Ärzten und Apothekern aus Wissenschaft und Praxis.

¹ Pharm.-Rat F. Reuter, Stadtapothekendirektor, Berlin C 2, Hauptgesundheitsamt.

Erläuterungen

1. Man verschreibe die fettgedruckte Arzneiformel mit dem Zusatz RF. — Wenn vom Arzt keine besondere Gebrauchsanweisung gegeben wird, ist stets diejenige der Formelsammlung anzuwenden; letzteres gilt auch für die Angabe „Nach Bericht“ und „Nach Verordnung“.
Die bei den Formeln gemachten Zusätze wie „Vor dem Gebrauch zu schütteln“, „Vorsicht“ dürfen nicht vergessen werden.
2. Die Einteilung der Formelsammlung erfolgte nicht nach therapeutischen Gesichtspunkten, sondern in alphabetischer Folge ausschließlich nach Indikationsgebieten. Die einzelnen Gruppen gliedern sich dabei in folgender Reihe: Flüssigkeiten, Pulver, Pillen, Tees, Suppositorien, Pasten, Salben.
3. Es liegt im Wesen und bedeutet den Wert der Rezepturarzneien, daß diese stets frisch bereitete werden; das gilt besonders für solche, die Digitalis, Lebertran usw. enthalten. Leicht verderbliche wäßrige Arzneien, insbesondere Dekokte und Infuse, auch Emulsionen werden zweckmäßigerweise mit Aqua conservans (Nipagin-Nipasol 1:1000) bereitet, und zwar im Verhältnis 0,7 Nipagin zu 0,3 Nipasol. — Pepsin ist in Lösungen stets am Schluß zuzusetzen.
4. An Stelle von *Oleum Olivarum* kann in den meisten Fällen bei vorübergehenden Beschaffungsschwierigkeiten *Oleum Arachidis*, *Oleum Sesami* oder *Oleum Rapae* verwendet werden.
5. Es hat sich erwiesen, daß bei den üblichen Flaschen einschließlich Tropfflaschen das Abzählen der Tropfen ungenau ist. Die konstantesten Ergebnisse erzielt man bei den in der Deutschen Arzneitaxe unter Ziffer c der Preisliste der Gefäße aufgeführten Tropfgläsern (homöopathische Gläser), die aus diesem Grunde zu bevorzugen sind. Bei starkwirkenden Mitteln wurde

deshalb die ccm-Darreichung eingeführt, die genauer dosiert. Dazu ist ein Meßgläschen erforderlich; entsprechende Flaschen mit im Schraubdeckel befindlichen Meßgläschen werden z. B. als sogenanntes M-Glas von der Fa. Remy, Koblenz, hergestellt.

6. Die Herstellung der Suppositorien mit der Masse Postonal erfordert beim Gieß- und Preßverfahren häufig einen geringen Zusatz von Aqua destillata oder Adeps Lanae; in einer Fußnote wird in den betreffenden Fällen darauf hingewiesen.
7. Die Preise derjenigen Arzneimittel, die nicht in der Arzneitaxe aufgeführt sind, wurden nach der Ergänzungstaxe bzw. den Bestimmungen der DAT errechnet.

Inhalts- und Preisverzeichnis

in alphabetischer Zusammenstellung

In den nachstehend aufgeführten Preisen sind Gefäße nicht eingegriffen. Bei Neuverschreibung kommt der Gefäßpreis, bei Reiteration die Gefäßreinigungsgebühr zu den angeführten Preisen hinzu, außerdem die Umsatzsteuer.

Sämtliche Preise sind nach der Deutschen Arzneytaxe errechnet; in den Fällen, wo der Preis der ganzen und halben Dosis der gleiche ist, wird nur ersterer verzeichnet.

Nr.			Dos.1	Dos.1/2
149	Adstringens dentifricium	30 g	2.31	1.61
45	Amylium nitrosum compositum	12 g	-80	-65
60	Analgeticum externum I	100 g	1.18	-88
61	Analgeticum externum II	100 g	1.90	1.23
216	Aqua Chloroformii	200 g	-65	
145	Aqua dentifricia	200 g	-53	-45
250	Aqua ophthalmica	200 g	1.05	
200	Balsamum contra Pertussim	30 g	1.13	-98
121	Collodium Jodoformii ..	15 g	-85	
122	Collodium salicylatum ..	20 g	-95	
217	Decoctum Chinae	200 g	1.44	1.35
218	Decoctum Condurango ..	200 g	1.30	
219	Decoctum Gentianae ...	200 g	1.50	1.43
172	Decoctum Primulae	200 g	1.35	1.23
173	Decoctum Saponariae ..	200 g	1.20	
174	Decoctum Senegae	200 g	1.45	1.33
175	Decoctum Violae	200 g	1.38	1.23
187	Elixir contra Tussim ..	20 g	1.30	1.10
150	Emulsio Paraffini	200 g	1.35	-85
152	Emulsio Paraffini cum Belladonna	200 g	1.50	-95
151	Emulsio Paraffini cum Phenolphthaleino	200 g	1.40	-90
225	Extractum stomachicum	30 g	-86	-70
226	Extractum stomachicum B	30 g	1.15	-85

Nr.			Dos.1	Dos.½
62	Frictio iodata	50 g	2.41	1.41
146	Gargarisma antisepticum	100 g	1.50	1.25
147	Gargarisma Chamomillae compositum	30 g	1.08	-.80
143	Globuli antiseptici	12St.	2.42	1.65
25	Guttae Adonidis compo- sitae	20 g	1.93	1.10
239	Guttae antihydroticae .	20 g	-.80	-.75
26	Guttae antiscleroticae ..	30 g	2.14	1.60
207	Guttae antotalgicae	15 g	1.45	1.20
188	Guttae Bromoformii ...	30 g	1.40	-.88
189	Guttae contra Tussim I.	20 g	1.43	1.03
190	Guttae contra Tussim II	20 g	1.50	1.20
27	Guttae Crataegi compo- sitae	30 g	1.64	1.39
84	Guttae Durande	20 g	-.88	-.70
157	Guttae Frangulae cum Belladonna	20 g	1.25	-.95
68	Guttae Papaverini com- positae.....	20 g	1.45	1.15
28	Guttae Scillae cum Va- leriana	20 g	1.09	-.85
191	Guttae Thymi cum Ephe- drin	20 g	1.80	1.20
223	Infusum Absinthii	200 g	1.50	1.45
19	Infusum Adonidis	200 g	1.65	1.50
20	Infusum Digitalis	200 g	1.45	1.40
21	Infusum Digitalis cum Theobromino	200 g	1.70	1.60
176	Infusum Ipecacuanhae..	200 g	1.50	1.33
153	Infusum laxans	200 g	1.20	1.13
154	Infusum Rhei	200 g	1.75	1.55
22	Infusum Scillae	200 g	1.20	
251	Infusum Secalis cornuti	200 g	1.60	1.23
46	Inhalatio antasthmatica	10 g	2.25	1.75
205	Inhalatio composita ...	10 g	-.93	-.90
206	Inhalatio rhodanata ...	15 g	1.35	1.30
78	Injectio adstringens com- posita	200 g	1.05	
79	Injectio adstringens mitis	200 g	-.85	
80	Injectio adstringens sim- plex	200 g	-.85	

Nr.			Dos.1	Dos.1/2
81	Injectio antiseptica	200 g	-85	
82	Injectio Argenti compo- sita	200 g	1.05	
83	Injectio usitata	200 g	-85	
112	Jodoformium desodora- tum	10 g	1.50	1.25
63	Linimentum Chloroformii	100 g	1.05	-85
123	Liquor Arnicae	100 g	-80	-60
177	Liquor pectoralis	200 g	-90	-63
117	Lotio alba	100 g	1.65	1.25
242	Lotio antiphlogistica . . .	50 g	1.08	1. -
118	Lotio cosmetica	200 g	1.25	1.08
119	Lotio Tumenoli aquosa .	100 g	1.53	1.24
120	Lotio Tumenoli spirituosa	100 g	2.17	1.61
178	Maceratio Althaeae	200 g	1.23	1.10
220	Mixtura Acidi hydrochlo- rici	200 g	-70	-65
255	Mixtura Acidi phospho- rici	200 g	-70	-65
11	Mixtura analgetica pro infantibus	100 g	1.05	
179	Mixtura antemphysema- tica	200 g	1.95	1.43
1	Mixtura antidiarrhoica pro infantibus	100 g	1.48	1.20
252	Mixtura antidysmenor- rhoica	200 g	1.55	1.30
253	Mixtura antidysmenor- rhoica B	200 g	1.60	1.35
76	Mixtura antiluica	200 g	1.65	1.35
58	Mixtura antirheumatica .	200 g	1.70	-98
23	Mixtura antisclerotica . .	300 g	1.68	1.40
2	Mixtura Bismuti subsali- cylici	200 g	1.30	-98
221	Mixtura Calami	200 g	1.83	1.13
256	Mixtura Calcii chlorati .	300 g	1.70	-91
222	Mixtura Centaurii	200 g	1.45	1.15
135	Mixtura diuretica	200 g	-80	-65
136	Mixtura diuretica cum Coffeino	200 g	1.63	1.28
163	Mixtura hypnotica	100 g	1.15	

Nr.			Dos. 1	Dos. 1/2
180	Mixtura Ipecacuanhae .	200 g	1.20	-83
164	Mixtura nervina	200 g	1.05	
224	Mixtura Pepsini	200 g	1.50	1.13
181	Mixtura Primulae	200 g	-95	-78
182	Mixtura Primulae fortis	200 g	1.20	1.25
24	Mixtura Scillae	200 g	1.05	-85
165	Mixtura sedativa	200 g	1.75	1.30
183	Mixtura solvens	200 g	-95	
184	Mixtura solvens cum Ephedrin	200 g	1.15	
185	Mixtura solvens fortis ..	200 g	1.95	1.50
208	Mixtura tonica	200 g	1.15	1.05
166	Mixtura Valerianae bro- mata	300 g	1.31	1.15
47	Mucilago Chenopodii ...	100 g	1.50	1.18
3	Mucilago Salep	200 g	1.50	1.30
245	Oleum Jecoris cum Cal- cio	200 g	3.34	1.99
201	Oleum nasale	20 g	1.35	1.25
64	Oleum Sinapis salicyla- tum	50 g	1.19	1.02
155	Paraffinum aromaticum	200 g	2.05	1.35
243	Pasta antiphlogistica ...	200 g	2.27	1.47
89	Pasta antiseptica	50 g	1.20	1.05
90	Pasta exsiccans	50 g	1.55	1.30
91	Pasta refrigerans	50 g	-95	
92	Pasta Zinci mollis <i>C. M. Rep</i>	50 g	1.13	-94
240	Pilulae Agaricini	30 St.	1.45	1.15
59	Pilulae antarthriticae ...	60 St.	2.43	1.65
34	Pilulae antihypertonicae	30 St.	1.38	1.25
159	Pilulae aperitivae cum Belladonna	30 St.	1.75	1.45
73	Pilulae Atropini	60 St.	1.30	1.05
194	Pilulae bechicae	30 St.	2.05	1.55
212	Pilulae Chinini cum Ferro	60 St.	1.94	1.45
88	Pilulae cholagogae	60 St.	2.35	1.55
195	Pilulae contra Tussim .	30 St.	1.50	
35	Pilulae Digitalis	60 St.	2.-	1.30
196	Pilulae Ephedrin compo- sitae	30 St.	2.05	1.53
197	Pilulae expectorantes ..	30 St.	1.75	1.25
213	Pilulae Ferri arsenicosi .	60 St.	1.70	1.45

Nr.			Dos. 1	Dos. 1/2
214	Pilulae Ferri lactici	60 St.	1.25	1.40 1.15
215	Pilulae Ferri reducti	60 St.	1.40	1.15
198	Pilulae Guajacoli	60 St.	1.35	1.05
142	Pilulae hydragogae	60 St.	1.85	1.50
9	Pilulae Ichthyoli	60 St.	1.23	-.90
199	Pilulae Kreosoti	60 St.	1.60	1.25
160	Pilulae laxantes	60 St.	1.45	1.20
161	Pilulae laxantes fortes	60 St.	2.28	1.70
162	Pilulae purgantes	60 St.	1.95	1.45
36	Pilulae Scillae	30 St.	1.20	1.05
254	Pilulae Secalis cornuti	30 St.	1.75	1.30
156	Potio ricinosa	200 g	1.35	1. -
6	Pulvis adsorbens	50 g	1.10	1.05
7	Pulvis adstringens	30 g	1.90	1.40
12	Pulvis analgeticus	12 St.	1.40	1.15
13	Pulvis analgeticus fortis	6 St.	1.31	1.25
233	Pulvis antacidus	50 g	-.88	-.85
42	Pulvis antasthmaticus	12 St.	1.70	1.43
43	Pulvis antasthmaticus fortis	12 St.	2.19	1.89
8	Pulvis antidiarrhoicus	12 St.	1.75	1.25
14	Pulvis antidolorosus cum Chinino	12 St.	1.39	1.15
258	Pulvis antinfectiosus fortis	6 St.	1.95	1.43
257	Pulvis antinfectiosus simplex	6 St.	1.05	-.95
15	Pulvis antineuralgicus	12 St.	1.87	1.31
71	Pulvis antistenocardialis	12 St.	1.45	1.15
234	Pulvis Belladonnae compositus	50 St.	2.25	1.60
113	Pulvis Bismuti subgallici	50 g	1.29	1. -
246	Pulvis Calcii compositus	50 g	1.63	1.30
32	Pulvis cardialis sedativus	12 St.	1.25	-.95
70	Pulvis Chelidonii	12 St.	1.64	1.15
87	Pulvis cholagogus	12 St.	1.33	-.95
114	Pulvis contra Decubitum	100 g	1.80	1.40
49	Pulvis contra Oxyures	12 St.	1.15	-.95
33	Pulvis Digitalis cum Theobromino	12 St.	1.30	1. -
139	Pulvis diureticus	200 g	1.94	1.35
235	Pulvis gastricus	30 g	1.55	1.20
52	Pulvis haemorrhoidalis	50 g	1.05	
53	Pulvis haemorrhoidalis B	50 g	1.10	1.05

Nr.			Dos.1	Dos.1 ²
115	Pulvis Ichthyoli compo-			
	situs	50 g	1.25	
158	Pulvis laxans vegetabilis	50 g	1.70	-90
236	Pulvis regulans	100 g	1.05	
140	Pulvis Salol compositus	12 St.	1.15	-95
141	Pulvis Salol cum Bella-			
	donna	12 St.	1.25	-95
51	Pulvis Santonini fortis .	12 St.	2.30	1.50
50	Pulvis Santonini mitis .	12 St.	1.70	1.15
169	Pulvis sedativus	12 St.	1.35	-95
116	Pulvis siccans	50 g	1.55	1.20
170	Pulvis somniferus	6 St.	1.30	1.10
72	Pulvis spasmolyticus ...	12 St.	1.65	1.25
237	Pulvis stomachicus	30 g	1.40	1.03
124	Remedium antiscabio-			
	sum	100 g	3.20	1.88
125	Remedium antiscabio-			
	sum B	100 g	2.63	1.44
148	Remedium contra Gingi-			
	vitim	20 g	1.45	1.13
48	Remedium contra Tae-			
	niam	ca. 40 g	2.71	1.45
202	Remedium nasale	20 g	1.50	1.35
126	Sapo Picis liquidae	200 g	2.50	1.65
186	Sirupus Codeini.....	100 g	1.60	1.18
127	Solutio antiseptica	100 g	1.45	1.20
144	Solutio Jodi „Lugol“ ..	200 g	2.55	1.60
259	Solutio physiologica			
	„Ringer“	500 g	2.45	1.98
137	Solutio urodesiniciens .	200 g	2.05	
10	Species antidiarrhoicae .	100 g	2.10	1.23
37	Species antiscleroticae .	100 g	1.26	-85
44	Species broncho-asthma-			
	ticae.....	100 g	1.55	1.05
238	Species deflatulentes ...	100 g	3.10	1.71
65	Spiritus Chloroformii			
	compositus	100 g	2.05	1.25
128	Spiritus contra Decubi-			
	tum	200 g	2.05	1.38
129	Spiritus crinalis I	100 g	2.22	1.56
130	Spiritus crinalis II	100 g	2.95	2.05
131	Spiritus crinalis III ...	100 g	2.32	1.66

Nr.			Dos.1	Dos. ¹ / ₂
132	Spiritus crinalis IV	100 g	2.70	1.50
133	Spiritus crinalis V	100 g	2.95	2.02
241	Spiritus Formalin	50 g	1.30	-98
16	Suppositoria analgetica	6 St.	1.28	1.05
18	Suppositoria anticolica	6 St.	1.52	1.15
17	Suppositoria antineural- gica	6 St.	2.15	1.50
54	Suppositoria asellata	12 St.	1.72	1.25
55	Suppositoria Chamomil- lae	6 St.	1.22	-95
74	Suppositoria Chelidonii	6 St.	1.17	-85
38	Suppositoria Digitalis	6 St.	1.13	-90
39	Suppositoria Digitalis cum Theobromino	6 St.	1.31	1.10
77	Suppositoria Ichthyoli composita	6 St.	1.29	1.05
40	Suppositoria Scillae	6 St.	1.10	-85
171	Suppositoria somnifera	6 St.	1.49	1.05
75	Suppositoria spasmoly- tica	6 St.	1.65	1.25
227	Tinctura amara acida	30 g	-95	-70
228	Tinctura amara acida B	30 g	1.65	1.09
41	Tinctura antasthmatica cum Ephedrin	23 g	2.20	1.75
4	Tinctura antidiarrhoica	15 g	1.10	-90
5	Tinctura antidiarrhoica B	15 g	-90	
69	Tinctura antispastica	30 g	1.38	-93
134	Tinctura Arning	30 g	2.18	1.70
29	Tinctura cardialis	30 g	1.60	1.-
229	Tinctura Carvi composita	20 g	1.57	1.-
85	Tinctura cholagoga	20 g	-95	-90
86	Tinctura cholagoga fortis	30 g	1.20	1.09
30	Tinctura Convallariae cum Coffeino	20 g	1.75	1.20
31	Tinctura Digitalis compo- sita	30 g	2.20	1.63
192	Tinctura expectorans	30 g	1.55	1.25
209	Tinctura Ferri arsenicalis	20 g	-60	-55
210	Tinctura Ferro-tonica I.	20 g	-80	-79
211	Tinctura Ferro-tonica II	20 g	-80	-60
193	Tinctura Kreosoti	30 g	1.75	1.08
230	Tinctura Pepsini	30 g	1.38	1.25
167	Tinctura sedativa	15 g	1.05	-75

Nr.			Dos.1	Dos.1/2	
168	Tinctura sedativa fortis	30 g	2.85		2.72
231	Tinctura stomachica....	30 g	1.45	1.15	2.05
232	Tinctura stomachica B.	30 g	1.40	-95	
247	Unguentum Aethylmorphini	10 g	1.65	1.26	
93	Unguentum anaestheticum	50 g	1.38	1.15	
244	Unguentum antiphlogisticum	50 g	1.25	1.10	
94	Unguentum antiscabiosum I	200 g	2.30	1.43	
95	Unguentum antiscabiosum II	200 g	2.47	1.63	
66	Unguentum Capsici aquosum	50 g	1.44	1.27	
96	Unguentum contra Combustiones.....	50 g	1.10	1.05	
97	Unguentum contra Decubitus	50 g	1.47	1.26	
98	Unguentum contra Fissuras	50 g	1.73	1.40	
99	Unguentum contra Impetigines	50 g	1.27	1.06	
100	Unguentum contra Perionies	50 g	1.33	-99	
101	Unguentum contra Ulcera	50 g	2.05	1.40	
102	Unguentum diachylon phenolatum	50 g	1.49	1.12	
103	Unguentum granulans .	100 g	1.23	1.02	
56	Unguentum haemorrhoidale	50 g	1.93	1.40	
57	Unguentum Hamamelidis	50 g	1.30	1.08	
104	Unguentum Jodi	50 g	1.45	1.18	
105	Unguentum Karwendoli	50 g	1.50	1.03	
106	Unguentum Naftalani ..	50 g	1.65	1.30	
203	Unguentum nasale	20 g	1.35		
204	Unguentum nasale cum Protargol	10 g	1.05		
107	Unguentum nigrum	30 g	1.09	1.05	
248	Unguentum Noviform ..	10 g	1.15	1.07	
108	Unguentum Olei Jecoris	100 g	1.75	1.25	

Nr.			Dos. 1	Dos. 1/2
249	Unguentum ophthalmi- cum	10 g	-95	
109	Unguentum Pellidol ...	30 g	1, -	-85
110	Unguentum sulfuratum rubrum	50 g	1,42	1,25
67	Unguentum Veratrini ...	30 g	1,22	1,15
111	Unguentum Wilkinsonii	100 g	1,85	1,51
138	Urodesinficiens liquidum	30 g	1,25	-80

Adstringentia, Antidiarrhoica

Siehe auch Supp. anticol. Nr. 18.

1. **Mixt. antidiarrh. pro infant. RF**

Mixtura antidiarrhoica pro infantibus

- Rp. Bismuti subgallici
 Extracti Thymi fluidi aa 5,0
 Mucilaginis Tylose¹ 25,0
 Aquae destillatae ad 100,0
 M. D. S. Zweistündlich einen Teelöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.28; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.08

2. **Mixt. Bism. subsalicyl. RF**

Mixtura Bismuti subsalicylici

- Rp. Bismuti subsalicylici 4,0
 Mucilaginis Tylose¹ 50,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.10; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.98

3. **Mucil. Salep RF**

Mucilago Salep

- Rp. Mucilaginis Tuberum Salep : 2,0 : 190,0
 Tincturae Allii sativi¹ 6,0
 Tincturae Foeniculi comp. ad 200,0
 M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.40; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

4. Tct. antidiarrh. RF

Tinctura antidiarrhoica

Rp. Tincturae Strychni 2,0
Tincturae Opii simplicis 3,0
Tincturae Tormentillae 10,0
M. D. S. Dreimal täglich fünfzehn Tropfen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.85

5. Tct. antidiarrh. B RF

Tinctura antidiarrhoica B

Rp. Tincturae Gentianae 2,0
Tincturae Opii simplicis 3,0
Extracti Salviae fluidi¹ 10,0
M. D. S. Dreimal täglich fünfzehn Tropfen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.90

6. Pulv. adsorb. RF

Pulvis adsorbens

Rp. Magnesiaae peroxydatae
Boli albae āā 12,5
Carbonis animalis ad 50,0
M. f. pulv.
D. S. Dreistündlich einen gestrichenen Teelöffel.
Dos. 1 = 1.10; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch

7. **Pulv. adstring. RF**

Pulvis adstringens

Rp. Rhizomatis Tormentillae pulv.

Bismuti subgallici

Carbonis medicinalis āā 10,0

M. f. pulv.

D. S. Dreimal täglich einen gestrichenen
Teelöffel.

Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

8. **Pulv. antidiarrhoic. RF**

Pulvis antidiarrhoicus

Rp. Phenyli salicylici 0,2

Carbonis medicinalis 0,3

Tannini albuminati 0,5

M. f. pulv.

D. tal. dos. Nr. XII.

S. Dreimal täglich ein Pulver.

Dos. 1 = 1.75; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

9. **Pil. Ichthyol. RF**

Pilulae Ichthyoli

Rp. Ammonii sulfoichthyolici 3,0

Sacchari Lactis q.s. (12,0)

M. f. pil. Nr. LX.

D. S. Dreimal täglich zwei Pillen.

Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

10. Spec. antidiarrhoic. RF

Species antidiarrhoicae

Rp. Rhizomatis Tormentillae minut.
conc. 50,0
Foliorum Menthae piperitae
Florum Chamomillae āā 20,0
Florum Arnicae 10,0
M. D. S. Einen Eßlöffel voll mit einer
Tasse heißen Wassers überbrühen.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.83

11. Mixt. analg. pro infant. RF

Mixtura analgetica pro infantibus

Rp. Aminophenazoni 1,0
 Sirupi Aurantii Florum 20,0
 Aquae destillatae ad 100,0
 M. D. S. Dreimal täglich ein bis zwei Tee-
 löffel voll nach Alter.
 Dos. I = 1.05

12. Pulv. analget. RF

Pulvis analgeticus

Rp. Coffeini 0,05
 Aminophenazoni 0,15
 Phenacetini 0,3
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. XII.
 S. Bei Schmerzen ein Pulver.
 Dos. I = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

13. Pulv. analget. fort. RF

Pulvis analgeticus fortis

Rp. Codeini phosphorici 0,02
 Aminophenazoni 0,3
 Acidi diaethylbarbiturici 0,2
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. VI.
 S. Bei Schmerzen bis dreimal täglich ein
 Pulver.
 Dos. I = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

14. **Pulv. antidolor. c. Chinin. RF**

Pulvis antidolorosus cum Chinino

X
Rp. Chinini tannici 0,1
Acidi acetylo-salicylici
Phenacetini āā 0,3
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII.
S. Bis viermal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.39; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

15. **Pulv. antineuralg. RF**

Pulvis antineuralgicus

X
Rp. Codeini phosphorici 0,02
Acidi acetylo-salicylici
Phenacetini āā 0,3
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII
S. Bei Schmerzen bis viermal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.75; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

16. **Supp. analget. RF**

Suppositoria analgetica

X
Rp. Natrii diaethylbarbiturici 0,15
Aminophenazoni 0,3
Massae suppositor.¹ q. s.
M. f. suppositorium
D. tal. dos. Nr. VI
S. Bei Schmerzen bis dreimal täglich ein Zäpfchen.
Dos. 1 = 1.28; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

¹ Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.
Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3.

17. **Supp. antineuralg. RF**

Suppositoria antineuralgica

Rp. Codeini phosphorici 0,05
 Acidi acetylo-salicylici
 Phenacetini āā 0,5
 Massae suppositor.¹ q. s.
 M. f. suppositorium
 D. tal. dos. VI
 S. Bei Schmerzen bis dreimal täglich ein
 Zäpfchen.
 Dos. 1 = 2.00; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.43

18. **Supp. anticolic. RF**

Suppositoria anticolica

Rp. Opii concentrati 0,02
 Extracti Belladonnae 0,03
 Massae suppositor.² q. s.
 M. f. suppositorium
 D. tal. dos. Nr. VI
 S. Nach besonderer Anweisung bis drei-
 mal täglich ein Zäpfchen.
 Dos. 1 = 1.40; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.10

¹ Bei Gießverfahren: Postonal ad 2,5.

Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3.

² Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.

Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3.

Angiotica und Cardiaca

Angiot.

19. Inf. Adon. RF

Infusum Adonidis

Rp. Infusi Herbarum Adonidis

„Stada“ 7,0 : 175,0

Liquoris Kalii acetici 10,0

Sirupi Corticis Aurantii . . . ad 200,0

M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.

Dos. 1 = 1.65; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.50

20. Inf. Digit. RF

Infusum Digitalis.

Rp. Infusi Digitalis (Fol. titr.) . 1,25 : 190,0

Tincturae Menthae piperitae . . . 10,0

M. D. S. Drei- bis viermal täglich einen
Eßlöffel.

Dos. 1 = 1.35

21. Inf. Digit. c. Theobr. RF

Infusum Digitalis cum Theobromino

Rp. Infusi Digitalis (Fol. titr.) . . 1,25 : 185,0

Theobromino-natrii salicylici . . . 5,0

Tincturae Menthae piperitae . . . 10,0

M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.

Dos. 1 = 1.60; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.55

22. Inf. Scill. RF

Infusum Scillae

Rp. Infusi Bulbi Scillae „Stada“ 1,5 : 180,0
Sirupi Cerasorum ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 1.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

23. Mixt. antisclerot. RF

Mixtura antisclerotica

Rp. Liquoris Natrii silicici 6,0
Natrii jodati 0,6
Natrii benzoici 3,0
Tincturae Aurantii 6,0
Sirupi simplicis 40,0
Aquae destillatae ad 300,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 1.58; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.40

24. Mixt. Scill. RF

Mixtura Scillae

Rp. Liquoris Kalii acetici 30,0
Tincturae Scillae „Stada“ 6,0
Sirupi simplicis 20,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

25. Gutt. Adon. comp. RF

Guttae Adonidis compositae

Rp. Extracti Adonidis „Stada“.

Tincturae Digitalis

Tincturae Valerianae āā ad 20,0

M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw. drei-
ßig Tropfen.

Dos. 1 = 1.47; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.96

26. Gutt. anticlerot. RF

Guttae antiscleroticae

X Rp. Kalii jodati 1,0

Mentholi valerianici 12,0

Spiritus ad 30,0

M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen

Dos. 1 = 1.88; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.45

27. Gutt. Crataeg. comp. RF

Guttae Crataegi compositae

X Rp. Ammonii rhodanati 3,0

Tincturae Allii sativi¹

Extracti Crataegi fluidi¹ āā ad 30,0

M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen

Dos. 1 = 1.64; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.39

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

28. Gutt. Scill. c. Val. RF

Guttae Scillae cum Valeriana

- X
Rp. Extracti Valerianae fluidi 4,0
Tincturae Scillae „Stada“ ad 20,0
M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw. vier-
zig Tropfen.
Dos. 1 = 1.09; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

29. Tct. card. RF

Tinctura cardialis

- X
Rp. Tincturae Convallariae ex Herba
recenti 20,0
Extracti Crataegi fluidi¹ 10,0
M. D. S. Dreimal täglich $\frac{1}{2}$ ccm bzw.
zwanzig Tropfen.
Dos. 1 = 1.10; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.75

30. Tct. Convall. c. Coff. RF

Tinctura Convallariae cum Coffeino

- Rp. Coffeinum-Natrii benzoici 2,0
Tincturae Convallariae ex Herba
recenti ad 20,0
M. D. S. Dreimal täglich $\frac{1}{2}$ ccm bzw.
zwanzig Tropfen.
Dos. 1. = 1.20; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.00

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

31. Tct. Digit. comp. RF

Tinctura Digitalis composita

Rp. Tincturae Digitalis 15,0
Aetheris acetici 5,0
Tincturae Valerianae aethereae . ad 30,0
M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw.
dreißig Tropfen.
Dos. 1 = 1.23; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.98

32. Pulv. card. sedat. RF

Pulvis cardialis sedativus

Rp. Glandularum Lupuli 0,2
Herbarum Adonidis „Stada“ . . 0,5
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
S. Dreimal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

33. Pulv. Digit. c. Theobrom. RF

Pulvis Digitalis cum Theobromino

Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) . . 0,1
Theobromino-natrii salicylici . . . 0,5
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII
S. Viermal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.00

34. Pil. antihyperton. RF

Pilulae antihypertonicae

X
Rp. Acidi phenylaethylbarbiturici . . . 1,5
Extracti Belladonnae 0,3
Extracti Faecis 2,0
Glycerini et Aquae āā q. s.
M. f. pil. Nr. XXX
D. S. Dreimal täglich eine Pille.
Dos. 1 = 1.28; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

35. Pil. Digital. RF

Pilulae Digitalis

X
Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) . . . 6,0
Extracti Faecis 2,0
Glycerini q. s.
M. f. pil. Nr. LX
D. S. Dreimal täglich eine Pille.
Dos. 1 = 1.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30

36. Pil. Scill. RF

Pilulae Scillae

Rp. Bulbi Scillae „Stada“
Extracti Faecis āā 3,0
Glycerini et Aquae āā q. s.
M. f. pil. Nr. XXX
D. S. Dreimal täglich eine Pille.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

37. Spec. antisclerot. RF

Species antiscleroticæ

Rp. Visci albi

Florum Crataegi āā 25,0

Herbarum Rutæ

Herbarum Equiseti āā 20,0

Herbarum Bursæ Pastoris . . . 10,0

M. D. S. Einen Eßlöffel voll mit einer
Tasse heißen Wassers überbrühen.

Dos. 1 = 1.16; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.84

38. Supp. Digital. RF

Suppositoria Digitalis

Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) . 0,1

Massae suppositor.¹ q. s.

M. f. suppositorium

D. tal. dos. Nr. VI

S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.

Dos. 1 = 1.13; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.90

39. Supp. Digit. c. Theobrom. RF

Suppositoria Digitalis cum Theobromino

Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.) . 0,1

Theobromino-natrii salicylici . . 0,5

Massae suppositor.² q. s.

M. f. suppositorium

D. tal. dos. Nr. VI

S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.

Dos. 1 = 1.31; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.10

¹ Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.

Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3.

² Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.

Bei Preßverfahren: Postonal ad 2,3.

40. **Supp. Scill. RF**

Suppositoria Scillae

Rp. Bulbi Scillae „Stada“ 0,1
Massae suppositor.¹ q. s.
M. f. suppositorium
D. tal. dos. Nr. VI
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.
Dos. 1 = 1.10; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

¹ Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.
Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3.

Antasthmatica

41. Tct. antasthm. c. Epedr. RF

Tinctura antasthmatica cum Ephedrin

Antasthm.

Rp. Ephedrin hydrochlorici 1,0
 Kalii jodati 2,0
 Tincturae Lobeliae
 Tincturae Stramonii āā 10,0
 M. D. S. Im Anfall zwanzig Tropfen.
 Dos. 1 = 1.55; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.40

42. Pulv. antasthm. RF

Pulvis antasthmaticus

Rp. Herbarum Lobeliae pulv. 0,08
 Herbarum Adonidis „Stada“ 0,2
 Antipyretici comp. 0,8
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
 S. Bei Bedarf bis dreimal täglich ein
 halbes bis ein Pulver.
 Dos. 1 = 1.70; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.43

43. Pulv. antasthm. fort. RF

Pulvis antasthmaticus fortis

Rp. Ephedrin hydrochlorici 0,04
 Foliorum Belladonnae pulv. 0,06
 Herbarum Lobeliae pulv. 0,08
 Calcii citrici 0,1
 Antipyretici comp. 0,9
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
 S. Bei Bedarf bis dreimal täglich ein
 halbes bis ein Pulver.
 Dos. 1 = 2.19; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.89

44. Spec. broncho-asthm. RF

Species broncho-asthmaticae

- Rp. Fructus Anisi contus.
Corticis Quebracho āā 10,0
Foliorum Farfarae
Radici Primulae minut. conc.
Foliorum Salviae
Herbarum Plantaginis āā 20,0
M. D. S. Einen Eßlöffel voll mit einer
Tasse heißen Wassers überbrühen.
Dos. 1 = 1.05

45. Amyl. nitros. comp. RF

Amylium nitrosum compositum

- Rp. Amylii nitrosi
Spiritus Aetheris nitrosi āā 6,0
M. D. S. Fünf Tropfen auf das Taschentuch zum Einatmen.
Dos. 1 = 0.75; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.65

46. Inhal. antasthm. RF

Inhalatio antasthmatica

- Rp. Atropini sulfurici 0,02
Pantocaini 0,1
Kalii sulfurici 0,2
Solutionis Suprarenini (1:1000) 6,0
Glycerini ad 10,0
M. D. S. Fünf Tropfen vernebeln nach
Anweisung.
Dos. 1 = 2.20; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.75

Anthelmintica

Anthelm.

47. Mucil. Chenopod. RF

Mucilago Chenopodii

Rp. Olei Chenopodii 1,2
Olei Ricini 20,0
Mucilaginis Tylose¹ 50,0
Tincturae Allii sativi¹ 10,0
Aquae Menthae piperitae ad 100,0
M. D. S. Kinder morgens je nach Alter
ein bis zwei Teelöffel voll um 7, 8 und
9 Uhr an 2 Tagen hintereinander.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.13

48. Remed. contr. Taen. RF

Remedium contra Taeniam

Rp. Calomel 0,3
Extracti Filicis 8,0
Sirupi Rubi Idaei 32,0
M. D. S. Nüchtern in zwei Portionen
innerhalb von zwei Stunden. Vor
dem Gebrauch kräftig zu schütteln.
Dos. 1 = 2.27; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.51

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

49. Pulv. ctr. Oxyur. RF

Pulvis contra Oxyures

✓
Rp. Aluminii sulfurici 0,1
Aluminii acetici basici 0,9
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII
S. Dreimal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

50. Pulv. Santon. mit. RF

Pulvis Santonini mitis

✓
Rp. Santonini
Calomel āā 0,025
Sacchari Lactis 0,25
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII
S. Dreimal täglich vor dem Essen ein
Pulver.
Dos. 1 = 1.65; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

51. Pulv. Santon. fort. RF

Pulvis Santonini fortis

✓
Rp. Santonini
Calomel āā 0,05
Sacchari Lactis 0,5
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII
S. Dreimal täglich ein Pulver vor dem
Essen.
Dos. 1 = 2.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.45

Antihaemorrhoidalia

Siehe auch Dermatica S. 55
und Suppositoria Ichthyoli comp. Nr. 77

52. Pulv. haemorrh. RF

Pulvis haemorrhoidalis

Rp. Foliorum Sennae pulv.
Magnesiae ustae
Sacchari pulv.
Sulfuris depurati
Tartari depurati āā 10,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel.
Dos. 1 = 1.05

A-haemorrh.

53. Pulv. haemorrh. B RF

Pulvis haemorrhoidalis B

Rp. Corticis Frangulae pulv. subt. . . 15,0
Sacchari pulv. 5,0
Magnesiae ustae
Sulfuris depurati
Tartari depurati āā 10,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel.
Dos. 1 = 1.05

54. Supp. asellat. RF

Suppositoria asellata

Rp. Paraffini solidi 0,2
Alcohol cetylici 0,4
Olei Jecoris Aselli 1,4
M. f. suppositorium
D. tal. dos. Nr. XII
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.
Dos. 1 = 1.55; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

55. **Supp. Chamom. RF**

Suppositoria Chamomillae

Rp.	Florum Chamomillae pulv.	. . .	0,5
	Perugeni		0,1
	Massae suppositor. ¹		q. s.
	M. f. suppositorium		
	D. tal. dos. Nr. VI		
	S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.		
	Dos. 1 = 1.17; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95		

56. **Ungt. haemorrh. RF**

Unguentum haemorrhoidale

Rp.	Extracti Hamamelidis fluidi		
	Bismuti subgallici	āā	5,0
	Aethylii p-aminobenzoici		2,5
	Unguenti mollis	ad	50,0
	M. D. S. Äußerlich.		
	Dos. 1 = 1.68; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.28		

57. **Ungt. Hamamel. RF**

Unguentum Hamamelidis

Rp.	Aquae Hamamelidis		5,0
	Lanolini		5,0
	Vaselini albi		40,0
	M. D. S. Äußerlich.		
	Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95		

¹ Bei Gießverfahren: Postonal ad 2,5.

Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3.

Antirheumatica und Antarthritica

58. Mixt. antirheum. RF

A-rheumat.

Mixtura antirheumatica

X
Rp. Natrii salicylici 10,0
Tincturae Aurantii 5,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Viermal täglich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.98

59. Pil. antarthrit. RF

Pilulae antarthriticae

X
Rp. Colchicini. 0,05
Lithii citrici 4,5
Extracti Faecis
Radicis Liquiritiae pulv. āā 5,0
Glycerini q. s.
M. f. pil. Nr. LX
D. S. Dreimal täglich eine Pille.
Dos. 1 = 2.38; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.65

60. **Analg. ext. I** RF

Analgeticum externum I

X

Rp.	Chloroformii	5,0
	Methylii salicylici	25,0
	Mucilaginis Tylose ¹	50,0
	Aquae destillatae	ad 100,0
	M. D. S. Einreibung. Vor dem Gebrauch zu schütteln.	
	Dos. 1 = 1.18; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.88	

61. **Analg. ext. II** RF

Analgeticum externum II

X

Rp.	Olei Sinapis	1,0
	Borneoli salicylici	20,0
	Mucilaginis Tylose ¹	50,0
	Aquae destillatae	ad 100,0
	M. D. S. Einreibung. Vor dem Gebrauch zu schütteln.	
	Dos. 1 = 1.90; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.23	

62. **Frict. jodat. RF**

Frictio jodata

X

Rp.	Aetheris jodati	2,5
	Spiritus Rosmarini	
	Tincturae Capsici	āā ad 50,0
	M. D. S. Einreibung. Vor dem Gebrauch zu schütteln.	
	Dos. 1 = 1.22; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.81	

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

63. **Linim. Chloroform. RF**

Linimentum Chloroformii

X Rp. Chloroformii 20,0
Linimenti ammoniati ad 100,0
M. D. S. Einreibung. Vor dem Gebrauch
zu schütteln.
Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

64. **Ol. Sinap. salicylat. RF**

Oleum Sinapis salicylatum

X Rp. Methylii salicylici 5,0
Olei Sinapis 1,0
Chloroformii 10,0
Olei Rapae ad 50,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 1.02; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

65. **Spir. Chlorof. comp. RF**

Spiritus Chloroformii compositus

X Rp. Chloroformii
Spiritus saponati āā 20,0
Spiritus Juniperi ad 100,0
M. D. S. Einreibung.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

66. Ungt. Capsic. aq. RF

Unguentum Capsici aquosum

8

Rp. Mentholi synth.	0,5
Capsicini		
Olei Rosmarini	āā 1,5
Mucilaginis Tylose ¹	ad 50,0
M. D. S. Äußerlich.		
Dos. 1	= 1.39; Dos. ½	= 1.27

67. Ungt. Veratr. RF

Unguentum Veratrini

X

Rp. Veratrini	0,3
Chloroformii	3,0
Unguenti mollis	ad 30,0
M. D. S. Äußerlich.		Vorsicht!
Dos. 1	= 1.22; Dos. ½	= 1.15

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

Antispasmodica

68. Gutt. Papav. comp. RF

Guttae Papaverini compositae

Rp. Atropini sulfurici 0,01
Papaverini hydrochlorici 0,4
Aquae destillatae ad 20,0
M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw.
fünfundzwanzig Tropfen.
Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

A-spasm.

69. Tct. antispast. RF

Tinctura antispastica

Rp. Tincturae Belladonnae 15,0
Tincturae Valerianae
Spiritus Menthae piperitae $\bar{a}\bar{a}$ ad 30,0
M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw.
vierzig Tropfen.
Dos. 1 = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

70. Pulv. Chelidon. RF

Pulvis Chelidonii

Rp. Triturationis Chelidonii „Stada“
Calcii carbonici praecipitati $\bar{a}\bar{a}$ 0,5
Extracti Belladonnae 0,02
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
S. Dreimal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.60; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

71. **Pulv. antistenocard. RF**

Pulvis antistenocardialis

Rp. Natrii phenylaethylbarbiturici . . . 0,02
 Natrii nitrosi 0,1
 Theobromino-Natrii salicylici . . . 0,5
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
 S. Dreimal täglich ein Pulver.
 Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

72. **Pulv. spasmol. RF**

Pulvis spasmolyticus

Rp. Papaverini hydrochlorici
 Extracti Belladonnae . . . āā 0,02
 Acidi phenylaethylbarbiturici . . . 0,015
 Sacchari albi 0,5
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
 S. Dreimal täglich ein bis zwei Pulver.
 Dos. 1 = 1.61; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

73. **Pil. Atrop. RF**

Pilulae Atropini

(pro dos. 0,0005 Atrop. sulfuric.)

Rp. Atropini sulfurici 0,03
 Extracti Faecis 6,0
 Glycerini q. s.
 ad M. f. pil. Nr. LX
 D. S. Dreimal täglich eine Pille.
 Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

74. **Supp. Chelidon. RF**

Suppositoria Chelidonii

Rp. Triturationis Chelidonii „Stada“ 0,5
Massae suppositor.¹ q. s.
M. f. suppositorium
D. tal. dos. Nr. VI
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.
Dos. 1 = 1.17; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

75. **Supp. spasmol. RF**

Suppositoria spasmolytica

Rp. Papaverini hydrochlorici 0,04
Extracti Belladonnae 0,03
Aminophenazoni 0,2
Massae suppositor.¹ q. s.
M. f. suppositorium
D. tal. dos. Nr. VI
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.
Dos. 1 = 1.65; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

¹ Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.
Bei Preßverfahren: Postonal mit 10% Adeps Lanae ad 2,3.

Antivenerica

76. Mixt. antiluic. RF

Mixtura antiluica

X
Rp. Hydrargyri bijodati 0,1
Kalii jodati 10,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel
voll in Milch.
Dos. 1 = 1.20; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.10

A-vener.

77. Supp. Ichthyol. comp. RF

Suppositoria Ichthyoli composita

X
Rp. Ammonii sulfoichthyolici 0,3
Extracti Belladonnae 0,02
Massae suppositor.¹ q. s.
M. f. suppositorium
D. tal. dos. Nr. VI
S. Dreimal täglich ein Zäpfchen.
Dos. 1 = 1.29; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

78. Inj. adstr. comp. RF

Injectio adstringens composita

X
Rp. Zinci sulfurici
Plumbi acetici āā 1,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch
zu schütteln.
Dos. 1 = 1.05

¹ Nur Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.

79. Inj. adstr. mit. RF

Injectio adstringens mitis

Rp. Zinci sulfophenolici 0,5
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 0.85

80. Inj. adstr. simpl. RF

Injectio adstringens simplex

Rp. Zinci sulfurici 0,5
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 0.85

81. Inj. antisept. RF

Injectio antiseptica

Rp. Argenti nitrici 0,02
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 0.85

82. Inj. Argent. comp. RF

Injectio Argenti composita

Rp. Albargini 0,2
Phenazoni 2,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 1.05

83. Inj. usitat. RF

Injectio usitata

Rp. Argenti proteinici 0,5
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 0.85

Cholagoga

Siehe auch Infusum Rhei Nr. 154, Pulvis
Chelidonii Nr. 70, Suppositoria Chelidonii
Nr. 74, Suppositoria anticolica Nr. 18.

84. Gutt. Durand. RF

Guttae Durande

- Rp. Olei Terebinthinae rectificati . . . 5,0
Spiritus aetherei 15,0
M. D. S. Mehrmals täglich dreißig Tropfen.
Dos. 1 = 0.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.45

Cholag.

85. Tct. cholag. RF

Tinctura cholagoga

- Rp. Tincturae Cardui Mariae 10,0
Tincturae Chelidonii
Tincturae Strychni āā 5,0
M. D. S. Dreimal täglich $\frac{3}{4}$ ccm bzw.
dreißig Tropfen.
Dos. 1 = 0.90

86. Tct. cholag. fort. RF

Tinctura cholagoga fortis

- Rp. Tincturae Belladonnae 4,0
Tincturae Chelidonii
Tincturae Cardui Mariae
Spiritus Menthae piperitae āā ad 30,0
M. D. S. Dreimal täglich 1 ccm bzw.
vierzig Tropfen.
Dos. 1 = 1.10

87. **Pulv. cholag. RF**

Pulvis cholagogus

- Rp. Fellis Tauri depurati sicci 0,3
 Foliorum Menthae piperitae pulv.
 Magnesia^e ustae. āā 0,2
 M. f. pulv.
 D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
 S. Dreimal täglich ein bis zwei Pulver
 mit Wasser.
 Dos. 1 = 1.33; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

88. **Pil. cholag. RF**

Pilulae cholagogae

- Rp. Fellis Tauri depurati sicci 9,0
 Hydrargyri chlorati 1,0
 Extracti Taraxaci 5,0
 Glycerini et Aquae āā q. s.
 M. f. pil. Nr. LX
 D. S. Dreimal täglich zwei Pillen.
 Dos. 1 = 2.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.55

Dermatica

89. Past. antisept. RF

Pasta antiseptica

Rp.	Acidi salicylici pulv.	0,5
	Acidi borici pulv.	5,0
	Zinci oxydati crudi	10,0
	Unguenti mollis ad	50,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.20; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05	

90. Past. exsicc. RF

Pasta exsiccans

Rp.	Bismuti subgallici	5,0
	Zinci oxydati crudi	
	Talci	āā 12,5
	Olei Lini	10,0
	Adipis Lanae anhydrici . . ad	50,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.18	

Dermat.

91. Past. refrig. RF

Pasta refrigerans

Rp.	Cretae praeparatae	
	Zinci oxydati crudi	āā 15,0
	Olei Lini	
	Aquae Calcariae	āā 10,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 0.95	

92. **Past. Zinc. moll. RF**

Pasta Zinci mollis

Rp. Zinci oxydati crudi	15,0
Olei Olivari	10,0
Lanolini	ad 50,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 1.00; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.88	

93. **Ungt. anaesth. RF**

Unguentum anaestheticum

Rp. Aethylii p-aminobenzoici	2,5
Perugeni	10,0
Unguenti mollis	ad 50,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 1.38; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15	

94. **Ungt. antiscabios. I RF**

Unguentum antiscabiosum I

Rp. Sulfuris praecipitati	60,0
β -Naphtholi	10,0
Saponis kalini	50,0
Unguenti mollis	ad 200,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 2.20; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.43	

95. **Ungt. antiscabios. II RF**

Unguentum antiscabiosum II

Rp. β -Naphtholi	
Cretae praeparatae	āā 10,0
Saponis kalini	50,0
Unguenti mollis	ad 200,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 2.21; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.63	

96. Ungt. ctr. Combust. RF

Unguentum contra Combustiones

Rp.	Liquoris Aluminii acetici	20,0
	Aquae Hamamelidis	5,0
	Eucerini anhydrici	25,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.10; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05	

97. Ungt. ctr. Decub. RF

Unguentum contra Decubitum

Rp.	Zinci sulfurici	2,5
	Plumbi acetici	5,0
	Tincturae Myrrhae	1,0
	Unguenti mollis ad	50,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.47; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.26	

98. Ungt. ctr. Fissur. RF

Unguentum contra Fissuras

Rp.	Bismuti subgallici	
	Perugeni āā	5,0
	Olei Jecoris Aselli	10,0
	Pastae Zinci	
	Unguenti cerei āā	15,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.40; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.28	

99. Ungt. ctr. Impetig. RF

Unguentum contra Impetigines

Rp.	Hydrargyri praecipitati albi	
	Zinci oxydati crudi āā	4,0
	Unguenti mollis ad	50,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.27; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.06	

100. **Ungt. ctr. Pernion. RF**

Unguentum contra Perniones

Rp. Calcariae chloratae 5,0
 Unguenti Paraffini ad 50,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 1.33; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.99

101. **Ungt. ctr. Ulcer. RF**

Unguentum contra Ulcera

Rp. Rivanol 0,5
 Eucerini anhydrici 20,0
 Pastae Zinci ad 50,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 1.90; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.35

102. **Ungt. diachyl. phenol. RF**

Unguentum diachylon phenolatum

Rp. Phenoli liquefacti 1,0
 Unguenti diachylon ad 50,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 1.49; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.13

103. **Ungt. granul. RF**

Unguentum granulans

Rp. Olei Jecoris Aselli 10,0
 Terebinthinae laricinae 25,0
 Vaselini flavi ad 100,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 1.20; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.02

104. **Ungt. Jod. RF**

Unguentum Jodi

Rp. Jodi	0,5
Kalii jodati	2,5
Aquae destillatae	2,0
Unguenti mollis	ad 50,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 1.40; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.18	

105. **Ungt. Karwend. RF**

Unguentum Karwendoli

Rp. Ammonii sulfo-karwendolici	5,0
Unguenti mollis	ad 50,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.03	

106. **Ungt. Naftal. RF**

Unguentum Naftalani

Rp. Naftalani	
Adipis Lanae anhydrici	āā 20,0
Zinci oxydati crudi	7,0
Acidi borici pulv.	3,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 1.65; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30	

107. **Ungt. nigr. RF**

Unguentum nigrum

Rp. Argenti nitrici	0,3
Perugeni	3,0
Vasellini flavi	ad 30,0
M. D. S. Äußerlich.	
Dos. 1 = 1.09; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05	

108. **Ungt. Ol. Jecor. RF**

Unguentum Olei Jecoris

X

Rp.	Olei Jecoris Aselli	40,0
	Cumarini	0,2
	Unguenti mollis	ad 100,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.55; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15	

109. **Ungt. Pellid. RF**

Unguentum Pellidol

X

Rp.	Pellidol	0,6
	Vaselini flavi	ad 30,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.00; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85	

110. **Ungt. sulf. rubr. RF**

Unguentum sulfuratum rubrum

X

Rp.	Hydrargyri sulfurati rubri . . .	0,5
	Sulfuris sublimati	12,5
	Olei Bergamottae	0,5
	Unguenti mollis	ad 50,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.42; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25	

111. **Ungt. Wilkins. RF**

Unguentum Wilkinsonii

X

Rp.	Picis betulinae	
	Sulfuris sublimati	āā 15,0
	Cretae praeparatae	
	Adipis Lanae anhydrici . . .	āā 10,0
	Spiritus	5,0
	Unguenti mollis	ad 100,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.70; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.48	

112. **Jodoform. desodor. RF**

Jodoformium desodoratum

Rp. Olei Sassafras gtts. II
Jodoformii ad 10,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

113. **Pulv. Bism. subgall. RF**

Pulvis Bismuti subgallici

Rp. Bismuti subgallici 5,0
Zinci oxydati crudi
Talci āā ad 50,0
M. f. pulv.
S. Streupulver.
Dos. 1 = 1.04; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.88

114. **Pulv. ctr. Decub. RF**

Pulvis contra Decubitum

Rp. Cupri aluminati pulv. 2,0
Bismuti subgallici 10,0
Talci ad 100,0
M. f. pulv.
S. Streupulver.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

115. **Pulv. Ichthyol. comp. RF**

Pulvis Ichthyoli compositus

Rp. Ammonii sulfoichthyolici 2,0
Talci 20,0
Sulfidal 0,5
Amyli Tritici
Boli albae āā ad 50,0
M. f. pulv.
S. Streupulver.
Dos. 1 = 1.25

116. Pulv. sicc. RF

Pulvis siccans

Rp.

Aethylii p-aminobenzoici	2,5
Bismuti subgallici	5,0
Acidi borici pulv.	10,0
Boli albae	ad 50,0
M. f. pulv.	
S. Streupulver.	
Dos. 1 = 1.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.08	

117. Lot. alb. RF

Lotio alba

Rp.

Zinci oxydati crudi	
Talci	
Glycerini	
Spiritus	
Aquae destillatae	āā ad 100,0
M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor dem Gebrauch zu schütteln.	
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05	

118. Lot. cosm. RF

Lotio cosmetica

Rp.

Camphorae tritae	6,0
Mucilaginis Tylose ¹	50,0
Sulfuris praecipitati	25,0
Aquae Calcariae	ad 200,0
M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor dem Gebrauch zu schütteln.	
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.08	

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

119. Lot. Tumen. aqu. RF

Lotio Tumenoli aquosa

Rp. Tumenol-Ammonii 2,5
 Zinci oxydati crudi
 Talci
 Glycerini
 Aquae destillatae āā ad 100,0
 M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor
 dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.29; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

120. Lot. Tumen. spir. RF

Lotio Tumenoli spirituosa

Rp. Tumenol-Ammonii 2,5
 Zinci oxydati crudi
 Talci
 Glycerini āā 10,0
 Spiritus diluti ad 100,0
 M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor
 dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.78; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.39

121. Collod. Jodoform. RF

Collodium Jodoformii

Rp. Jodoformii 1,5
 Collodii elastici ad 15,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 0.85

122. Collod. salicyl. RF

Collodium salicylatum

Rp. Acidi salicylici 4,0
 Acidi lactici 2,0
 Collodii elastici ad 20,0
 M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln.
 Dos. 1 = 0.95

123. **Liq. Arnic. RF**

Liquor Arnicae

- Rp. Tincturae Arnicae 10,0
Liquoris Aluminii acetici ad 100,0
M. D. S. Äußerlich. Einen Eßlöffel voll
auf ein Glas Wasser. Vor dem Ge-
brauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.70; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.68

124. **Remed. antiscabios. RF**

Remedium antiscabiosum

- Rp. Styracis depurati 30,0
Spiritus ad 100,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 2.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.35

125. **Remed. antiscabios. B RF**

Remedium antiscabiosum B

- Rp. BenzylIIi benzoici 25,0
Spiritus ad 100,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.88

126. **Sapo Pic. liq. RF**

Sapo Picis liquidae

- Rp. Picis liquidae 40,0
Saponis kalini venalis
Spiritus āā 60,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch
zu schütteln.
Dos. 1 = 1.60; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

127. **Sol. antisept. RF**
Solutio antiseptica

Rp. Rivanol 0,1
Spiritus 20,0
Liquoris Aluminii acetici 40,0
Aqua destillatae ad 100,0
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch
zu schütteln.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

128. **Spir. ctr. Decub. RF**
Spiritus contra Decubitum

Rp. Spiritus 50,0
Spiritus camphorati 8,0
Perugeni gtts. II
Aqua destillatae ad 200,0
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch
zu schütteln.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.90

129. **Spir. crinal. I RF**
Spiritus crinalis I

Rp. Acidi salicylici 2,0
Spiritus camphorati 10,0
Spiritus diluti ad 100,0
M. D. S. Äußerlich.
Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.19

130. **Spir. crinal. II RF**
Spiritus crinalis II

Rp. Acidi tannici
Perugeni āā 2,0
Spiritus ad 100,0
M. D. S. Äußerlich. Vor dem Gebrauch
zu schütteln.
Dos. 1 = 1.80; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.33

131. **Spir. crinal. III** RF

Spiritus crinalis III

Rp. Chlorali hydrati 2,5
 Spiritus camphorati 10,0
 Spiritus diluti ad 100,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 1.60; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.29

132. **Spir. crinal. IV** RF

Spiritus crinalis IV

Rp. β -Naphtholi 0,5
 Spiritus diluti ad 100,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

133. **Spir. crinal. V** RF

Spiritus crinalis V

Rp. Resorcini 2,0
 Olei Ricini 1,0
 Spiritus ad 100,0
 M. D. S. Äußerlich.
 Dos. 1 = 1.80; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.34

134. **Tct. Arning** RF

Tinctura Arning

Rp. Tumenol-Ammonii 4,0
 Anthrarobini 1,0
 Aetheris 10,0
 Tincturae Benzoes 15,0
 M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor
 dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.70; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.35

Diuretica und Urodesinficientia

Siehe auch Angiotica und Cardiaca S. 29.

135. Mixt. diuret. RF

Mixtura diuretica

X Rp. Liquoris Kalii acetici 30,0
Aquaes Petroselini ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.81; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.65

136. Mixt. diuret. c. Coff. RF

Mixtura diuretica cum Coffeino

X Rp. Liquoris Kalii acetici 30,0
Coffeinum-Natrii salicylici 3,0
Sirupi simplicis 20,0
Aquaes Petroselini ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.38; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

Diuret

137. Sol. urodesinfic. RF

Solutio urodesinficiens

X Rp. Acidi phosphorici 6,0
Hexamethylentetramini 8,0
Aquaes destillatae ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 1.05

138. **Urodesinf. liquid. RF**

Urodesinficiens liquidum

Rp. Extracti Bucco fluidi 10,0
Extracti Uvae Ursi fluidi 20,0
M. D. S. Dreimal täglich einen halben
Teelöffel in heißem Wasser.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.80

139. **Pulv. diuret. RF**

Pulvis diureticus

X
Rp. Ureae purae 150,0
Acidi citrici 3,0
Elaeosacchari Citri ad 200,0
M. D. S. Eßlöffelweise in Selterwasser.
Dos. 1 = 1.89; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.35

140. **Pulv. Salol comp. RF**

Pulvis Salol compositus

X
Rp. Salol
Hexamethylenetetramini āā 0,3
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
S. Viermal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

141. **Pulv. Salol c. Bellad. RF**

Pulvis Salol cum Belladonna

X
Rp. Extracti Belladonnae 0,01
Salol 0,5
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.
S. Viermal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

142. **Pil. hydragog. RF**

Pilulae hydragogae

Rp. Foliorum Digitalis (pulv. titr.)

Bulbi Scillae „Stada“

Extracti Pimpinellae āā 1,5

Extracti Faecis 4,0

Glycerini q. s.

M. f. pil. Nr. LX

D. S. Dreimal täglich ein bis zwei Pillen.

Dos. 1 = 1.80; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.50

143. **Glob. antisept. RF**

Globuli antiseptici

Rp. Acidi lactici 2,7

Chinosol 0,36

Gelatinae albae 6,3

Glycerini 44,5

M. f. glob. vagin. Nr. XII

D. S. Dreimal täglich eine Kugel einzuführen.

Dos. 1 = 1.98; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.43

144. **Solut. Jod. „Lugol“ RF**

Solutio Jodi „Lugol“

Rp. Kalii jodati 5,0

Tincturae Jodi 20,0

Aquae destillatae ad 200,0

M. D. S. Äußerlich. Einen Eßlöffel voll auf einen Irrigator.

Dos. 1 = 1.20; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

Gargarismata und Dentifricia

145. Aq. dentifric. RF

Aqua dentifricia

Rp. Hydrogenii peroxydati soluti . 180,0
Liquoris Aluminii acetici . . . 20,0
M. D. S. Einen Eßlöffel voll auf ein Glas
Wasser zum Mundspülen.
Dos. 1 = 0.53; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.45

146. Gargar. antisept. RF

Gargarisma antisepticum

Rp. Subcutini. 1,0
Tincturae Arnicae 10,0
Aquae Salviae ad 100,0
M. D. S. Einen Eßlöffel voll auf ein Glas
Wasser zum Gurgeln.
Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

Gargar.

147. Gargar. Chamom. comp. RF

Gargarisma Chamomillae compositum

Rp. Extracti Chamomillae fluidi¹
Extracti Salviae fluidi¹ . . . āā 15,0
M. D. S. Zehn Tropfen auf ein Glas
Wasser zum Gurgeln.
Dos. 1 = 1.08; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.80

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

148. Remed. ctr. Gingivit. RF

Remedium contra Gingivitis

Rp. Acidi ascorbinici
Acidi citrici āā 0,3
Sirupi simplicis 3,0
Unguenti Glycerini ad 20,0
M. D. S. Zum Massieren des Zahnfleisches.
Dos. 1 = 1.37; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.08

149. Adstring. dentifric. RF

Adstringens dentifricium

Rp. Olei Salviae
Mentholi synth. āā 0,5
Tincturae Tormentillae ad 30,0
M. D. S. Zwanzig Tropfen auf ein Glas
Wasser zum Mundspülen.
Dos. 1 = 1.53; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.24

Laxantia, Purgantia

150. Emuls. Paraff. RF

Emulsio Paraffini 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.65

Rp. Saccharini 0,05
Olei Citri terpenfrei 0,2
Mucilaginis Tylose¹ 375,0
Paraffini liquidi 400,0
Aquae destillatae ad 1000,0

151. Emuls. Paraff. c. Phenolphthal. RF

Emulsio Paraffini c. Phenol-
phthaleino 200,0
M. D. S. Abends ein bis zwei Eßlöffel.
Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.70

Lax.

Rp. Phenolphthaleini 10,0
Saccharini 0,05
Olei Citri terpenfrei 0,2
Mucilaginis Tylose¹ 375,0
Paraffini liquidi 400,0
Aquae destillatae ad 1000,0

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

152. **Emuls. Paraff. c. Bell. RF**

Emulsio Paraffini c. Belladonna 200,0
M. D. S. Eßlöffelweise bis zu dreimal
täglich.

Dos. 1 = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.65

Rp. Extracti Belladonnae	2,0
Saccharini	0,05
Olei Citri terpenfrei	0,2
Mucilaginis Tylose ¹	375,0
Paraffini liquidi	400,0
Aquae destillatae	ad 1000,0

153. **Inf. lax. RF**

Infusum laxans

Rp. Infusi Foliorum Sennae conc. 15,0:155,0	
Magnesii sulfurici	45,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel voll in einem Glas Wasser. Vor dem Gebrauch zu schütteln.	

Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.13

154. **Inf. Rhei RF**

Infusum Rhei

Rp. Infusi Rhizomatis Rhei	8,0 : 165,0
Natrii bicarbonici	10,0
Tincturae Menthae piperitae	10,0
Sirupi simplicis	ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.	

Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 1.65; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.50

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

155. **Paraff. aromat. RF**

Paraffinum aromaticum

Rp. Olei Citrigtts. III
Paraffini liquidiad 200,0
M. D. S. Teelöffelweise zu nehmen. Vor
dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

156. **Pot. ricin. RF**

Potio ricinosa

Rp. Olei Ricini 40,0
Mucilaginis Tylose¹ 100,0
Sirupi simplicis 20,0
Aquae destillataead 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.80

157. **Gutt. Frangul. c. Bell. RF**

Guttae Frangulae cum Belladonna

Rp. Extracti Belladonnae 0,3
Extracti Frangulae fluidi. . .ad 20,0
M. D. S. Abends 1 ccm bzw. dreißig
Tropfen in Wasser.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

158. **Pulv. lax. veget. RF**

Pulvis laxans vegetabilis

- Rp. Fructus Rhamni catharticae pulv.
 Corticis Frangulae pulv. āā 20,0
 Fructus Foeniculi pulv. ad 50,0
 M. f. pulv.
 D. S. Mehrmals täglich einen Teelöffel
 voll mit Wasser.
 Dos. 1 = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

159. **Pil. aperitiv. c. Bell. RF**

Pilulae aperitivae cum Belladonna

- Rp. Extracti Belladonnae 0,3
 Extracti Aloes
 Extracti Rhei
 Extracti Faecis āā 2,0
 Glycerini q. s.
 M. f. pil. Nr. XXX
 D. S. Abends ein bis zwei Pillen.
 Dos. 1 = 1.65; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.45

160. **Pil. lax. RF**

Pilulae laxantes

- Rp. Aloes 6,0
 Tuberum Jalapae pulv. 3,0
 Extracti Faecis 3,0
 Glycerini q. s.
 M. f. pil. Nr. LX
 D. S. Abends ein bis zwei Pillen.
 Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

161. Pil. lax. fort. RF

Pilulae laxantes fortes

Rp.	Extracti Colocynthis	0,5
	Extracti Aloes	4,8
	Resinae Jalapae	
	Saponis medicati āā	2,4
	Extracti Faecis	3,0
	Glycerini	q. s.
	M. f. pil. Nr. LX	
	D. S. Abends ein bis zwei Pillen.	
	Dos. 1 = 2.23; Dos. 1/2 = 1.70	

162. Pil. purg. RF

Pilulae purgantes

Rp.	Extracti Rhei compositi	4,0
	Phenolphthaleini	3,0
	Extracti Frangulae spissi	3,0
	Extracti Faecis	4,0
	Glycerini	q. s.
	M. f. pil. Nr. LX	
	D. S. Abends ein bis zwei Pillen.	
	Dos. 1 = 1.95; Dos. 1/2 = 1.45	

Nervina, Sedativa, Hypnotica

163. Mixt. hypnot. RF

Mixtura hypnotica

Rp. Chloralhydrati 10,0
Kalii bromati 10,0
Scopolamini hydrobromici . . . 0,003
Aquae destillatae ad 100,0
M. D. S. Bei Bedarf bis dreimal täglich
einen Teelöffel.
Dos. 1 = 1.15

164. Mixt. nerv. RF

Mixtura nervina

Rp. Kalii bromati 8,0
Natrii bromati
Ammonii bromati āā 4,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 1.05

Nerv.

165. Mixt. sedat. RF

Mixtura sedativa

Rp. Natrii phenylallylbarbiturici . . . 2,0
Aminophenazoni 3,0
Natrii bromati 10,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Abends einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 1.75; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30

166. **Mixt. Valer. brom. RF**

Mixtura Valerianae bromata

X
Rp. Extracti Valerianae fluidi . . . 5,0
Natrii bromati 18,0
Aquae Melissae 150,0
Aquae destillatae ad 300,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.31; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

167. **Tct. sedat. RF**

Tinctura sedativa

Rp. Tincturae Castorei. 5,0
Extracti Valerianae fluidi . . . 10,0
M. D. S. Dreimal täglich zehn Tropfen.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.75

168. **Tct. sedat. fort. RF**

Tinctura sedativa fortis

Rp. Acidi phenylaethylbarbiturici . . 0,5
Olei Lavandulae
Olei Melissae āā gtts. III
Tincturae Castorei. 10,0
Tincturae Valerianae ad 30,0
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 2.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.85

169. **Pulv. sedat. RF**

Pulvis sedativus

Rp. Camphorae monobromatae

Glandularum Lupuli . . . āā 0,5

M. f. pulv.

D. tal. dos. Nr. XII ad chart. cerat.

S. Dreimal täglich ein Pulver in Ob-
laten.

Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

170. **Pulv. somnif. RF**

Pulvis somniferus

Rp. Acidi phenylallylbarbiturici

Ureae bromisovalerianylicae āā 0,3

Sacchari albi 0,5

M. f. pulv.

D. tal. dos. VI

S. Abends ein Pulver in heißem Wasser.

Dos. 1 = 1.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.10

171. **Supp. somnif. RF**

Suppositoria somnifera

Rp. Natrii phenylallylbarbiturici . . 0,2

Olei Valerianae 0,1

Massae suppositor.¹ q. s.

M. f. suppositorium

D. tal. dos. Nr. VI

S. Abends ein Zäpfchen.

Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

¹ Bei Gießverfahren: Postonal mit 10% Aqua destillata ad 2,5.

Bei Preßverfahren: Postonal ad 2,3.

Pectoralia

(Bechica und Expectorantia)

172. Dec. Primul. RF

Decoctum Primulae

Rp. Decocti Radicis Primulae . 6,0 : 175,0
Elixiris e Succo Liquiritiae ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.23

173. Dec. Saponar. RF

Decoctum Saponariae

Rp. Decocti Radicis Saponariae 10,0 : 180,0
Natrii carbonici 1,0
Sirupi simplicis ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 1.20

174. Dec. Seneg. RF

Decoctum Senegae

Pector.

Rp. Decocti Radicis Senegae . 10,0 : 175,0
Liquoris Ammonii anisati 5,0
Sirupi simplicis ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.30

175. **Dec. Viol. RF**

Decoctum Violae

Rp. Decocti Radicis Violae odoratae

2,0 : 170,0

Liquoris Ammonii anisati . . . 5,0

Sirupi simplicis ad 200,0

M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.

Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 1.23; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

176. **Inf. Ipec. RF**

Infusum Ipecacuanhae

Rp. Infusi Radicis Ipecacuanhae 0,5 : 175,0

Liquoris Ammonii anisati . . . 5,0

Sirupi simplicis ad 200,0

M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.

Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 1.30

177. **Liqu. pector. RF**

Liquor pectoralis

Rp. Sirupi Althaeae 30,0

Liquoris Ammonii anisati . . . 5,0

Aquae destillatae ad 200,0

M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.

Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 0.75; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.60

178. **Macerat. Alth. RF**

Maceratio Althaeae

Rp. Macerationis Radicis Althaeae

15,0 : 178,0

Acidi hydrochlorici diluti . . . 2,0

Sirupi simplicis ad 200,0

M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.

Dos. 1 = 1.00; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

179. **Mixt. antemphysem. RF**

Mixtura antemphysematica

- Rp. Theobromino-Natrii salicylici
Kalii jodati. āā 5,0
Tincturae Lobeliae 3,0
Liquoris Ammonii anisati 5,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Dreistündlich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.35

180. **Mixt. Ipec. RF**

Mixtura Ipecacuanhae

- Rp. Tincturae Ipecacuanhae 5,0
Liquoris Ammonii anisati 5,0
Sirupi simplicis 20,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.80; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.75

181. **Mixt. Primul. RF**

Mixtura Primulae

- Rp. Extracti Primulae fluidi 6,0
Liquoris Ammonii anisati 5,0
Sirupi simplicis 20,0
Aquae destillatae ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.80; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.75

182. **Mixt. Primul. fort. RF**

Mixtura Primulae fortis

- Rp. Codeini phosphorici 0,2
 Extracti Primulae fluidi 6,0
 Elixiris e Succo Liquiritiae . . . 20,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.60; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

183. **Mixt. solv. RF**

Mixtura solvens

- Rp. Ammonii chlorati
 Succi Liquiritiae depurati 5,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
 Dos. 1 = 0.95

184. **Mixt. solv. c. Ephedr. RF**

Mixtura solvens cum Ephedrin

- Rp. Ephedrin hydrochlorici 0,2
 Ammonii chlorati
 Succi Liquiritiae depurati 5,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
 Dos. 1 = 1.15

185. **Mixt. solv. fort. RF**

Mixtura solvens fortis

- Rp. Paracodin bitartarici 0,07
 Sirotol 1,5
 Ammonii chlorati
 Succi Liquiritiae depurati 5,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
 Dos. 1 = 1.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.50

186. **Sir. Cod. RF**

Sirupus Codeini

Rp. Codeini phosphorici 0,25
 Sirupi simplicis ad 100,0
 M. D. S. Je nach Alter dreimal täglich
 bis zu einem Teelöffel.
 Dos. 1 = 1.58; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.12

187. **Elix. ctr. Tuss. RF**

Elixir contra Tussim

Rp. Kalii jodati. 0,5
 Tincturae Pimpinellae
 Elixiris e Succo Liquiritiae āā ad 20,0
 M. D. S. Zweistündlich zwanzig Tropfen.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.05

188. **Gutt. Bromof. RF**

Guttae Bromoformii

Rp. Bromoformii
 Glycerini āā 5,0
 Spiritus 20,0
 M. D. S. Dreimal täglich zehn Tropfen.
 Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.70

189. **Gutt. ctr. Tuss. I RF**

Guttae contra Tussim I

Rp. Ammonii jodati 3,0
 Stadatrat Thymi ad 20,0
 M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen.
 Dos. 1 = 1.28; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.00

190. **Gutt. ctr. Tuss. II** RF

Guttae contra Tussim II

- Rp. Tincturae Aconiti 4,0
 Sirotol 2,0
 Stadatrat Primulae ad 20,0
 M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen.
 Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

191. **Gutt. Thym. c. Ephedr. RF**

Guttae Thymi cum Ephedrin

- Rp. Ephedrin hydrochlorici 2,0
 Stadatrat Thymi ad 20,0
 M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen.
 Dos. 1 = 1.80; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20

192. **Tct. expect. RF**

Tinctura expectorans

- Rp. Tincturae Ipecacuanhae
 Tincturae Pimpinellae
 Liquoris Ammonii anisati āā 10,0
 M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen. Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 0.80

193. **Tct. Kreosot. RF**

Tinctura Kreosoti

- Rp. Kreosoti 6,0
 Tincturae Gentianae 24,0
 M. D. S. Dreimal täglich zehn Tropfen in Wasser.
 Dos. 1 = 1.03; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.69

194. **Pil. bechic. RF**

Pilulae bechicae

Rp. Paracodin bitartarici	0,1
Sirotol	3,0
Extracti Helenii	1,5
M. f. pil. Nr. XXX	
D. S. Dreimal täglich eine Pille.	
Dos. 1 = 2.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.55	

195. **Pil. ctr. Tuss. RF**

Pilulae contra Tussim

Rp. Aethylmorphini hydrochlorici	0,1
Radicis Ipecacuanhae pulv.	0,18
Stibii sulfurati aurantiaci	0,3
Extracti Faecis	3,0
Glycerini	q. s.
M. f. pil. Nr. XXX	
D. S. Dreimal täglich eine Pille.	
Dos. 1 = 1.45	

196. **Pil. Ephedr. comp. RF**

Pilulae Ephedrin compositae

Rp. Ephedrin hydrochlorici	1,5
Sirotol	3,0
Extracti Pimpinellae	1,0
Glycerini	q. s.
M. f. pil. Nr. XXX	
D. S. Dreimal täglich eine Pille.	
Dos. 1 = 2.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.53	

197. **Pil. expect. RF**

Pilulae expectorantes

Rp. Terpini hydrati	āā	3,0
Sirotol		2,0
Extracti Pimpinellae		2,0
M. f. pil. Nr. XXX		
D. S. Dreimal täglich ein bis zwei Pillen.		
Dos. 1 = 1.75; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25		

198. **Pil. Guajac. RF**

Pilulae Guajacoli

Rp. Guajacoli	3,0
Radici Liquiritiae pulv.	6,0
Kalii carbonici	
Glycerini	āā 0,6
M. f. pil. Nr. LX	
D. S. Dreimal täglich ein bis zwei Pillen.	
Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05	

199. **Pil. Kreosot. RF**

Pilulae Kreosoti

Rp. Kreosoti	6,0
Carbonis medicinalis	4,0
Extracti Faecis	6,0
Glycerini	q. s.
M. f. pil. Nr. LX	
D. S. Dreimal täglich ein bis zwei Pillen.	
Dos. 1 = 1.55; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25	

200. **Balsam. ctr. Pertuss. RF**

Balsamum contra Pertussim

Rp. Olei Pini Pumilionis	
Olei Eucalypti	āā 2,5
Olei Succini rectificati	10,0
Olei camphorati fort.	ad 30,0
M. D. S. Zehn Tropfen zur Bruststein-	
reibung.	
Dos. 1 = 1.01; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95	

Rhinologica und Otologica

201. Ol. nasal. RF

Oleum nasale

Rp. Aetheris jodati gtts. II
Mentholi synth. 0,05
Olei Pini Pumilionis 0,5
Paraffini liquidi ad 20,0
M. D. S. Mehrere Tropfen in die Nase
träufeln. Vor dem Gebrauch zu
schütteln.
Dos. 1 = 1.25

202. Remed. nasal. RF

Remedium nasale

Rp. Ephedrin hydrochlorici 0,6
Olei Eucalypti gtts. X
Mentholi synth. 0,05
Olei Ricini 4,0
Mucilaginis Tylose¹ 10,0
Aquae destillatae ad 20,0
M. D. S. Mehrere Tropfen in die Nase
träufeln. Vor dem Gebrauch zu
schütteln.
Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.35

203. Ungt. nasal. RF

Unguentum nasale

Rp. Liquoris Aluminii acetici 5,0
Suprarenini hydrochlorici soluti
(1:1000) 0,5
Mentholi synth. 0,05
Adipis Lanae anhydrici 10,0
Paraffini liquidi ad 20,0
M. D. S. Nasensalbe.
Dos. 1 = 1.35

Rhinol.

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

204. **Ungt. nasal. c. Protarg. RF**

Unguentum nasale cum Protargol

Rp.	Protargol	0,1
	Paraffini liquidi	4,0
	Eucerini anhydrici	ad 10,0
	M. D. S. Nasensalbe.	
	Dos. 1 = 1.05	

205. **Inhal. comp. RF**

Inhalatio composita

Rp.	Olei Menthae piperitae	1,0
	Olei Pini Pumilionis	
	Eucalyptoli	āā ad 10,0
	M. D. S. Mehrere Tropfen zum Inha- lieren.	
	Dos. 1 = 0.78; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.75	

206. **Inhal. rhodan. RF**

Inhalatio rhodanata

Rp.	Olei Pini Pumilionis	2,0
	Spiritus Menthae piperitae	10,0
	Formaldehyd soluti	
	Kalii rhodanati	āā 1,5
	M. D. S. Mehrere Tropfen zum In- halieren.	
	Dos. 1 = 1.25	

207. **Gutt. antotalg. RF**

Guttae antotalgicae

Rp.	Phenazoni	1,0
	Pantocain	0,2
	Glycerini anhydrici	ad 15,0
	M. D. S. Ohrtropfen.	
	Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.20	

Roborantia

208. Mixt. ton. RF

Mixtura tonica

- Rp. Ferri glycerino-phosphorici . . . 3,0
Tincturae Aurantii . . . 2,0
Sirupi simplicis . . . 20,0
Aquaе destillatae . . . ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel
nach dem Essen.
Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

209. Tct. Ferr. ars. RF

Tinctura Ferri arsenicalis

- Rp. Liquoris Kalii arsenicosi . . . 5,0
Tincturae Ferri pomati . . ad 20,0
M. D. S. Nach Verordnung dreimal täglich steigend fünf bis zwanzig Tropfen. Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.68; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.60

210. Tct. Ferr.-ton. I RF

Tinctura Ferro-tonica I

- Rp. Tincturae Strychni . . . 1,0
Tincturae Ferri pomati
Tincturae aromaticae . . āā ad 20,0
M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.85; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.83

Robor.

211. Tct. Ferr.-ton. II RF

Tinctura Ferro-tonica II

Rp. Tincturae Ferri pomati

Tincturae Calami āā 10,0

M. D. S. Dreimal täglich zwanzig Tropfen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 0.60

212. Pil. Chin. c. Ferr. RF

Pilulae Chinini cum Ferro

Rp. Chinini sulfurici 1,8

Ferri reducti 6,0

Radici Gentianae pulv. 1,0

Extracti Faecis 4,0

Glycerini q. s.

M. f. pil. Nr. LX

D. S. Dreimal täglich zwei Pillen.

Dos. 1 = 1.80; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.40

213. Pil. Ferr. ars. RF

Pilulae Ferri arsenicosi

Rp. Acidi arsenicosi 0,06

Ferri reducti 3,6

Fructus Piperis nigri pulv. 1,8

Extracti Faecis 3,0

Glycerini q. s.

M. f. pil. Nr. LX

D. S. Dreimal täglich ein bis ansteigend drei Pillen.

Dos. 1 = 1.65; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.45

214. **Pil. Ferr. lact. RF**

Pilulae Ferri lactici

Rp. Ferri lactici	6,0
Radiciſ Gentianae pulv.	1,0
Extracti Faecis	5,0
Glycerini	q. s.

M. f. pil. Nr. LX

D. S. Dreimal täglich zwei bis drei Pillen.

Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

215. **Pil. Ferr. red. RF**

Pilulae Ferri reducti

Rp. Ferri reducti	6,0
Radiciſ Gentianae pulv.	2,0
Extracti Faecis	5,0
Glycerini	q. s.

M. f. pil. Nr. LX

D. S. Dreimal täglich zwei Pillen.

Dos. 1 = 1.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

Stomachica, Amara und Carminativa

216. Aqu. Chlorof. RF

Aqua Chloroformii

- Rp. Chloroformii 1,0
Aquae destillatae : 189,0
Succi Juniperi inspissati 10,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.65

217. Dec. Chin. RF

Decoctum Chinae

- Rp. Decocti Corticis Chinae . 10,0 : 170,0
Acidi hydrochlorici diluti . . . 3,0
Sirupi simplicis ad 200,0
M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.34; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30

218. Dec. Condurang. RF

Decoctum Condurango

- Rp. Decocti Corticis Condurango 15,0 : 180,0
Acidi hydrochlorici diluti . . . 3,0
Sirupi simplicis ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 1.30

Stom.

219. **Dec. Gentian. RF**

Decoctum Gentianae

Rp. Decocti Radicis Gentianae 5,0 : 197,0
 Resorcini resublimati 2,0
 Chloroformii 0,25
 M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.40

220. **Mixt. Acid. hydrochlor. RF**

Mixtura Acidi hydrochlorici

Rp. Acidi hydrochlorici diluti 7,0
 Tincturae Aurantii 3,0
 Sirupi simplicis 20,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Vor den Mahlzeiten einen Eß-
 löffel. Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 0.70; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.65

221. **Mixt. Calam. RF**

Mixtura Calami

Rp. Tincturae Calami 30,0
 Sirupi simplicis 25,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.08; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.75

222. **Mixt. Centaur. RF**

Mixtura Centaurii

Rp. Extracti Centaurii fluidi¹

Stadatrat Aurantii āā 15,0

Acidi hydrochlorici diluti 3,0

Sirupi simplicis 20,0

Aquae destillatae ad 200,0

M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.

Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

223. **Inf. Absinth. RF**

Infusum Absinthii

Rp. Infusi Herbarum Absinthii 10,0 : 170,0

Acidi hydrochlorici diluti 3,0

Stadatrat Aurantii 10,0

Sirupi simplicis ad 200,0

M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.

Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.45

224. **Mixt. Peps. RF**

Mixtura Pepsini

Rp. Pepsini c. Peptono „Stada“ 2,0

Acidi hydrochlorici diluti 3,0

Tincturae Aurantii 5,0

Aquae destillatae ad 200,0

M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel

vor den Mahlzeiten. Vor dem Ge-

brauch zu schütteln.

Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.13

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

225. Extr. stomach. RF

Extractum stomachicum

- Rp. Elixiris Aurantii comp.
Extracti Condurango fluidi āā 15,0
M. D. S. Vor den Mahlzeiten zwanzig
Tropfen in Wasser.
Dos. I = 0.93; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.70

226. Extr. stomach. B RF

Extractum stomachicum B


- Rp. Extracti Centaurii fluidi¹
Extracti Aurantii fluidi āā 15,0
M. D. S. Vor den Mahlzeiten zwanzig
Tropfen in Wasser.
Dos. I = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

227. Tct. amar. acid. RF

Tinctura amara acida

- X Rp. Acidi hydrochlorici 5,0
Tincturae amarae 25,0
M. D. S. Dreimal täglich fünfzehn Tropfen
in Wasser. Vor dem Gebrauch zu
schütteln.
Dos. I = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.70

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.



228. Tct. amar. acid. B RF

Tinctura amara acida B

Rp. Acidi hydrochlorici 5,0

Tincturae Calami

Tincturae Gentianae āā ad 30,0

M. D. S. Dreimal täglich fünfzehn Tropfen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 0.95; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

229. Tct. Carv. comp. RF

Tinctura Carvi composita

Rp. Olei Carvi 1,5

Tincturae Valerianae aethereae ad 20,0

M. D. S. Dreimal täglich dreißig Tropfen in Wasser.

Dos. 1 = 0.92; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.70

230. Tct. Peps. RF

Tinctura Pepsini

Rp. Pepsini

Acidi hydrochlorici diluti āā 2,0

Tincturae Strychni 3,0

Vini Chinae ad 30,0

M. D. S. Vor den Mahlzeiten dreißig Tropfen in einem Weinglas Wasser.

Vor dem Gebrauch zu schütteln.

Dos. 1 = 1.28; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.25

231. Tct. stomach. RF

Tinctura stomachica

Rp. Tincturae Chinae comp.
Tincturae Zingiberis
Tincturae Rhei vinosae . . . āā 10,0
M. D. S. Dreimal täglich dreißig Tropfen in Wasser. Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 0.85

232. Tct. stomach. B RF

Tinctura stomachica B

X
Rp. Tincturae Calami
Tincturae Gentianae
Tincturae Foeniculi comp. . . āā 10,0
M. D. S. Dreimal täglich dreißig Tropfen in Wasser.
Dos. 1 = 0.85

233. Pulv. antacid. RF

Pulvis antacidus

X
Rp. Magnesii peroxydati 15,0
Natrü bicarbonici ad 50,0
M. D. S. Dreimal täglich einen halben Teelöffel.
Dos. 1 = 0.93; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

234. **Pulv. Bellad. comp. RF**

Pulvis Belladonnae compositus

Rp. Extracti Belladonnae 0,5
Bismuti subnitrici 10,0
Olei Foeniculi gtts. V
Calcii carbonici praecipitati ad 50,0
M. D. S. Dreimal täglich eine Messer-
spitze.
Dos. 1 = 1.50; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30

235. **Pulv. gastr. RF**

Pulvis gastricus

Rp. Aluminium hydrici colloidal.
Bismuti subgallici āā 5,0
Magnesia peroxycati 20,0
M. D. S. Dreimal täglich eine Messer-
spitze.
Dos. 1 = 1.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.08

236. **Pulv. regul. RF**

* *Pulvis regulans*

Rp. Natrii sulfurici siccati
Natrii phosphorici siccati . . āā 40,0
Natrii bicarbonici 20,0
M. f. pulv.
D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel
in einem Glas Wasser.
Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

237. **Pulv. stom. RF**

Pulvis stomachicus

Rp. Bismuti subnitrici

Rhizomatis Rhei pulv. āā 5,0

Natrii bicarbonici 20,0

M. D. S. Dreimal täglich eine Messerspitze.

Dos. 1 = 1.15; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.98

238. **Spec. deflat. RF**

Species deflatulentes

Rp. Florum Chamomillae

Foliorum Menthae piperitae

Radici Valerianae āā 30,0

Fructus Carvi cont. 10,0

M. D. S. Einen Eßlöffel voll mit einer Tasse heißen Wassers überbrühen.

Dos. 1 = 1.55; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.96

Varia

Antihydrotica, Antiphlogistica, Antirachitica,
Ophthalmologica, Uterina u. a.

Antihydrotica

239. Gutt. antihydrot. RF

Guttae antihydroticae

Rp. Tincturae Belladonnae
Extracti Salviae fluidi¹ āā 10,0
M. D. S. Dreimal täglich dreißig Tropfen.
Dos. 1 = 0.70

240. Pil. Agaricin. RF

Pilulae Agaricini

Rp. Acidi agaricini 0,3
Extracti Faecis 3,0
Glycerini et Aquae āā q. s.
M. f. pil. Nr. XXX
D. S. Dreimal täglich eine Pille.
Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

241. Spir. Formalin RF

Spiritus Formalin

Rp. Formaldehyd soluti
Glycerini āā 5,0
Olei Lavandulae gtts. V
Spiritus diluti ad 50,0
M. D. S. Zum Pinseln.
Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.85

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

Antiphlogistica

242. Lot. antiphlogist. RF

Lotio antiphlogistica

X

Rp.	Zinci oxydati crudi	15,0
	Extracti Chamomillae fluidi ¹ . . .	10,0
	Mucilaginis Tylose ¹	ad 50,0
	M. D. S. Äußerlich. Zum Pinseln. Vor dem Gebrauch zu schütteln.	
	Dos. 1 = 1.08; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.00	

243. Past. antiphlogist. RF

Pasta antiphlogistica

X

Rp.	Acidi borici	4,0
	Olei Chamomillae aetherei	0,4
	Boli albae	120,0
	Aquae destillatae	40,0
	Glycerini	ad 200,0
	M. f. pasta	
	D. S. Zu Umschlägen.	
	Dos. 1 = 1.91; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30	

244. Ungt. antiphlogist. RF

Unguentum antiphlogisticum

X

Rp.	Extracti Chamomillae fluidi ¹	
	Aquae destillatae	āā 10,0
	Adipis Lanae anhydrici	ad 50,0
	M. D. S. Äußerlich.	
	Dos. 1 = 1.25; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.10	

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

Antirachitica

245. Ol. Jec. c. Calc. RF

Oleum Jecoris cum Calcio

Rp. Calcii phosphorici tribasici siccati 20,0
Vigantol 5,0
Olei Jecoris Aselli ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Teelöffel.
Vor dem Gebrauch zu schütteln.
Dos. 1 = 2.30; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.50

246. Pulv. Calc. comp. RF

Pulvis Calcii compositus

X Rp. Calcii glycerino-phosphorici . . 20,0
Natrii chlorati 2,0
Saponin 0,1
Calcii citrici ad 50,0
M. D. S. Mehrmals täglich eine Messer-
spitze.
Dos. 1 = 1.63; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30

Ophthalmologica

247. Ungt. Aethylmorph. RF

Unguentum Aethylmorphini

- X
Rp. Aethylmorphini hydrochlorici . . . 0,3
Lanolini
Vaselini albi f. Augensalbe . . . ad 10,0
M. D. S. Augensalbe.
Dos. 1 = 1.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.15

248. Ungt. Noviform RF

Unguentum Noviform

- X
Rp. Noviform 0,5
Lanolini
Vaselini albi f. Augensalbe . . . ad 10,0
M. D. S. Lidsalbe.
Dos. 1 = 1.10; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.05

249. Ungt. ophthalm. RF

Unguentum ophthalmicum

- X
Rp. Unguenti Hydrargyri flavi . . . 2,0
Vaselini albi f. Augensalbe . . . ad 10,0
M. D. S. Augensalbe.
Dos. 1 = 0.95

250. Aq. ophthalm. RF

Aqua ophthalmica

- X
Rp. Zinci sulfurici 0,4
Acidi borici soluti (3%) 100,0
Aquae Foeniculi ad 200,0
M. D. S. Äußerlich. Zur Augen-
waschung.
Dos. 1 = 1.15

251. Inf. Secal. corn. RF

Infusum Secalis cornuti

- Rp. Infusi Secalis cornuti . . . 8,0 : 180,0
 Tincturae Foeniculi compositae . . . 5,0
 Sirupi simplicis ad 200,0
 M. D. S. Zweistündlich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 2.00; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.53

252. Mixt. antidysmenorrh. RF

Mixtura antidysmenorrhoeica

- Rp. Aminophenazoni 3,0
 Extracti Viburni prunifolii fluidi . . . 10,0
 Sirupi Cinnamomi 20,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.55; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.30

253. Mixt. antidysmenorrh. B RF

Mixtura antidysmenorrhoeica B

- Rp. Aminophenazoni 3,0
 Extracti Millefolii fluidi¹ 15,0
 Sirupi Menthae piperitae 20,0
 Aquae destillatae ad 200,0
 M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
 Vor dem Gebrauch zu schütteln.
 Dos. 1 = 1.60; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.35

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

254. **Pil. Secal. corn. RF**

Pilulae Secalis cornuti

Rp. Extracti Secalis cornuti spiss.
Extracti Faecis āā 3,0
Glycerini et Aquae q. s.
M. f. pil. Nr. XXX
S. Dreimal täglich zwei Pillen.
Dos. 1 = 2.35; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.60

Sonstige

255. Mixt. Acid. phosph. RF

Mixtura Acidi phosphorici

Rp. Acidi phosphorici 10,0
Sirupi Rubi Idaei 30,0
Aquaе destillatae ad 200,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eßlöffel.
Dos. 1 = 0.85; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.70

256. Mixt. Calcii chlorat. RF

Mixtura Calcii chlorati

Rp. Liquoris Calcii chlorati 30,0
Tincturae Foeniculi compositae 5,0
Mucilaginis Tylose¹ 50,0
Sirupi simplicis 20,0
Aquaе destillatae ad 300,0
M. D. S. Dreimal täglich einen Eß- bzw.
Kinderlöffel. Vor dem Gebrauch zu
schütteln.
Dos. 1 = 1.10; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.91

257. Pulv. antinfect. simpl. RF

Pulvis antinfectiosus simplex

Rp. Acidi phenylchinolincarbonei
Acidi acetylo-salicylici āā 0,5
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. VI
S. Dreimal täglich ein Pulver in Selter-
wasser.
Dos. 1 = 1.05; Dos. $\frac{1}{2}$ = 0.95

¹ Herstellung: Stada-Vorschriftenbuch.

258. **Pulv. antinfect. fort. RF**

Pulvis antinfectiosus fortis

X
Rp. Acidi ascorbinici 0,1
Chinini sulfurici 0,15
Acidi acetylo-salicylici 0,5
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. VI
S. Dreimal täglich ein Pulver.
Dos. 1 = 1.90; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.43

259. **Solut. physiol. „Ringer“ RF**

Solutio physiologica „Ringer“

X
Rp. Natrii chlorati 4,0
Liquoris Calcii chlorati 0,25
Kalii chlorati 0,2
Aquae destillatae ad 500,0
M. sterilisa!
D. S. Zur Infusion.
Dos. 1 = 2.45; Dos. $\frac{1}{2}$ = 1.98

